

## 2017 - 2018 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students Grades K - 12

This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, §§97.61-97.72. This document is not intended as a substitute for the TAC, which has other provisions and details. The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements by the Texas Education Code, Chapter 38.

### IMMUNIZATION REQUIREMENTS

A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a child-care facility or public or private elementary or secondary school in Texas.

Vaccine Required (Attention to notes and footnotes)	Minimum Number of Doses Required by Grade Level												Notes
	Grades K - 6th						Grade 7th	Grades 8th - 12th					
	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Diphtheria/Tetanus/Pertussis <sup>1</sup> (DTaP/DTP/DT/Td/Tdap)	5 doses or 4 doses						3 dose primary series and 1 Tdap / Td booster <i>within the last 5 years</i>	3 dose primary series and 1 Tdap / Td booster <i>within the last 10 years</i>					<p><b>For K – 6<sup>th</sup> grade:</b> 5 doses of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine; 1 dose must have been received on or after the 4<sup>th</sup> birthday. However, 4 doses meet the requirement if the 4th dose was received on or after the 4<sup>th</sup> birthday. For students aged 7 years and older, 3 doses meet the requirement if 1 dose was received on or after the 4th birthday.</p> <p><b>For 7<sup>th</sup> grade:</b> 1 dose of Tdap is required if at least 5 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine.</p> <p><b>For 8<sup>th</sup> – 12<sup>th</sup> grade:</b> 1 dose of Tdap is required when 10 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine. Td is acceptable in place of Tdap if a medical contraindication to pertussis exists.</p>
Polio <sup>1</sup>	4 doses or 3 doses												<p><b>For K – 12<sup>th</sup> grade:</b> 4 doses of polio; 1 dose must be received on or after the 4<sup>th</sup> birthday. However, 3 doses meet the requirement if the 3<sup>rd</sup> dose was received on or after the 4<sup>th</sup> birthday.</p>
Measles, Mumps, and Rubella <sup>1,2</sup> (MMR)	2 doses												<p><b>For K – 12<sup>th</sup> grade:</b> 2 doses are required, with the 1<sup>st</sup> dose received on or after the 1<sup>st</sup> birthday. Students vaccinated prior to 2009 with 2 doses of measles and one dose each of rubella and mumps satisfy this requirement.</p>
Hepatitis B <sup>2</sup>	3 doses												<p>For students aged 11 – 15 years, 2 doses meet the requirement if adult hepatitis B vaccine (Recombivax<sup>®</sup>) was received. Dosage (10 mcg /1.0 mL) and type of vaccine (Recombivax<sup>®</sup>) must be clearly documented. If Recombivax<sup>®</sup> was not the vaccine received, a 3-dose series is required.</p>
Varicella <sup>1,2,3</sup>	2 doses												<p>The 1<sup>st</sup> dose of varicella must be received on or after the 1<sup>st</sup> birthday.</p> <p><b>For K – 12<sup>th</sup> grade:</b> 2 doses are required.</p>
Meningococcal <sup>1</sup> (MCV4)							1 dose						<p>For 7<sup>th</sup> – 12<sup>th</sup> grade, 1 dose of quadrivalent meningococcal conjugate vaccine is required on or after the student's 11<sup>th</sup> birthday.</p> <p><b>Note:</b> If a student received the vaccine at 10 years of age, this will satisfy the requirement.</p>
Hepatitis A <sup>1,2</sup>	2 doses												<p>The 1st dose of hepatitis A must be received on or after the 1<sup>st</sup> birthday.</p> <p><b>For K – 8<sup>th</sup> grade:</b> 2 doses are required.</p>

↓ Notes on the back page, please turn over. ↓

Rev. 03/2017

## Requisitos mínimos de vacunas en el estado de Texas de 2017 - 2018 para estudiantes de kínder a 12.o grado

Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados al Código Administrativo de Texas (TAC), título 25, Servicios de salud, secciones 97.61 a 97.72. Este documento no tiene como propósito sustituir al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. El Código de Educación de Texas, capítulo 38, confiere al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad para establecer los requisitos de inmunización.

### REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN

Los estudiantes deberán mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, asistir o ser transferidos a una guardería o una escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

Vacuna requerida (Vea las notas y notas de pie de página)	Número mínimo de dosis requeridas por nivel de grado												Notas	
	De kínder a 6.º grado						7.º grado	De 8.º a 12.º grado						
	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Difteria, tétanos, tos ferina <sup>1</sup> (DTaP, DTP, DT, Td, Tdap)	5 dosis o 4 dosis						Una serie primaria de 3 dosis y 1 refuerzo de la vacuna Tdap / Td dentro de los últimos 5 años	Una serie primaria de 3 dosis y 1 refuerzo de la vacuna Tdap / Td dentro de los últimos 10 años						<p><b>Para los grados kínder a 6.º:</b> 5 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina; debe haberse recibido 1 dosis en o después del 4.º cumpleaños. Sin embargo, con 4 dosis se cubre el requisito si la 4.ª dosis se recibió en o después del 4.º cumpleaños. Para los estudiantes de 7 años de edad o más, con 3 dosis cumplen con el requisito si recibieron 1 de las dosis en o después del 4.º cumpleaños.</p> <p><b>Para el 7.º grado:</b> Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos 5 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.</p> <p><b>Para los grados 8.º a 12.º:</b> Se requiere 1 dosis de la vacuna Tdap cuando hayan pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos. La vacuna Td es aceptable en lugar de la vacuna Tdap si existe una contraindicación médica para la vacuna contra la tosferina.</p>
Polio <sup>1</sup>	4 dosis o 3 dosis												<p><b>Para los grados kínder a 12.º:</b> 4 dosis de la vacuna contra la polio; debe recibirse 1 dosis en o después del 4.º cumpleaños. Sin embargo, con 3 dosis se cumple con el requisito si la 3.ª dosis se recibió en o después del 4.º cumpleaños.</p>	
Sarampión, paperas y rubeola <sup>1,2</sup> (MMR)	2 dosis												<p><b>Para los grados kínder a 12.º:</b> Se requieren 2 dosis de la vacuna, la 1.ª de las cuales debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños. Los estudiantes que fueron vacunados antes de 2009 con 2 dosis contra el sarampión y una dosis contra la rubeola y una dosis contra las paperas cumplen con este requisito.</p>	
Hepatitis B <sup>2</sup>	3 dosis												<p>Para los estudiantes de 11 a 15 años de edad, con 2 dosis cumplen con el requisito si recibieron la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax<sup>®</sup>). Tanto la dosis (10 mcg / 1.0 mL) como el tipo de vacuna (Recombivax<sup>®</sup>) deben documentarse claramente. Si la vacuna recibida no fue Recombivax<sup>®</sup>, se requiere una serie de 3 dosis.</p>	
Varicela <sup>1,2,3</sup>	2 dosis												<p>La 1.ª dosis de la vacuna contra la varicela debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños.</p> <p><b>Para los grados kínder a 12.º:</b> Se requieren 2 dosis.</p>	
Vacuna antimeningocócica <sup>1</sup> (MCV4)							1 dosis						<p><b>Para los grados 7.º a 12.º,</b> se requiere 1 dosis de la vacuna antimeningocócica tetravalente conjugada en o después del 11.º cumpleaños del estudiante. <b>Nota:</b> Si un estudiante recibió la vacuna a los 10 años de edad, esto satisface el requisito.</p>	
Hepatitis A <sup>1,2</sup>	2 dosis												<p>La 1.ª dosis de la vacuna contra la hepatitis A debe recibirse en o después del 1.º cumpleaños.</p> <p><b>Para los grados kínder a 8.º:</b> Se requieren 2 dosis.</p>	

↓ Notas al reverso, por favor dé la vuelta. ↓

Rev. 03/2017